



staatsbosbeheer

Engelsmanplaat

Zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog



Engelsmanplaat: Natuur en getij beheersen het leven

Paradijs voor duizenden vogels

Midden in het krachtenspel van zand, wind en water ligt in het zee-gat tussen Ameland en Schiermonnikoog de Engelsmanplaat. Het is een groep van zandplaten met een eigen wantij naar de Friese kust. Een gebied waar natuur en getij het leven volledig beheersen.

Altijd in beweging

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was Engelsmanplaat nog een eiland met duintjes en begroeiing. Door wind en stroming is de plaat

lager geworden en de begroeiing verdwenen. Nu vangt het Rif al het zand op dat de Noordzee aanvoert en is het de hoogste zandbank geworden. Het Rif is steeds in beweging en wandelt zuidwaarts in de richting van Engelsmanplaat. Hierdoor wordt het oude Smeriggat, de vaargeul tussen het Rif en Engelsmanplaat, steeds ondieper.

Rijk aan voedsel

De Waddenzee heeft een voedselrijke bodem en vogels weten dat.

Daarom strijken ze hier in het voor- en najaar met duizenden neer om hun hongerige magen te vullen en bij te tanken voordat ze weer verder trekken.

Veel vogels zijn op doorreis van hun overwinteringsgebied in Afrika naar hun broedgebied in Groenland, Scandinavië of Siberië. De Waddenzee en dus ook Engelsmanplaat zijn een onmisbare tussenstop.

Rusten, slapen en veren poetsen

Tijdens laagwater, zwermen de wadvogels uit over het drooggevallen wad. Ze eten hun buik rond aan de overvloed aan pieren, garnaltjes en schelpdieren. Als het water weer




stijgt verzamelen ze zich massaal op de zandplaten die met hoogwater droog blijven. Op deze zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen wachten ze dicht bij elkaar op het komende laagwater. De tijd besteden ze aan uitrusten, slapen en veren poetsen.

Zwart van de vogels

Het Rif en Engelsmanplaat zijn zulke hoogwatervluchtplaatsen. In de zomer van 2006 werden hier ruim 54.000 vogels geteld met hoogwater. Het is belangrijk dat deze vogels ongestoord laagwater kunnen afwachten. Elke verstoring betekent immers energieverlies en dat moe-



De dwergstern bidt laag boven het water om daarna duikstotend een kleine vis te vangen.



ten ze weer goedmaken door extra te eten.

Broeden op het randje

In het broedseizoen strijken op het Oostrif vaak Scholeksters, Noordse stern en Dwergsterns neer om te broeden. Hier hebben ze niets te duchten van vossen, ratten of honden. Ze nemen het risico dat hun nesten, eieren en jongen wegspoelen met springtij en harde noordwester wind op de koop toe. Er zijn maar weinig van dit soort plekken in het waddengebied waar deze zeldzame sterns zonder verstoring kunnen broeden.

Rusten op de bank

's Zomers is Engelsmanplaat te druk voor zeehonden. Deze zoeken daarom de rustige zandbanken aan de westkant op. Regelmatig liggen op

't Bultje en het Zuidplaatje meer dan 200 zeehonden te zonnen en te rusten.

Wees welkom

De zorg van Engelsmanplaat en het Rif is toevertrouwd aan Staatsbosbeheer. Wij willen u volop de gelegenheid geven om van deze de unieke omgeving te kunnen genieten. Maar we vragen u wel rekening te houden met de natuur. Vandaar dat in het broedseizoen een deel van het Oostrif door borden is afgesloten voor bezoekers. Met laagwater bent u van harte welkom op Engelsmanplaat en bij de vogelwachters die in het huisje wonen. Rond hoogwater (van ca. 3 uur voor tot ca. 3 uur na) zijn Engelsmanplaat en het Rif hoogwatervluchtplaatsen en mogen deze niet betreden worden om verstoring van rustende vogels te voorkomen. De vogelwachters en Staatsbosbeheer wensen u een fijn verblijf in het Engelsmanplaat gebied.

Vogeltelling, augustus 2006

Scholeksters	4.000
Kanoetstrandlopers	36.500
Drieteenstrandlopers	1.000
Bonte strandloper	5.000
Rosse grutto	3.000
Wulp	2.000
Zilvermeeuwen	1.000
Overig	2.050